

**関税分類例規集新旧対照表**

新		旧		備 考
0302.12 0303.11	<u>1.べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ)</u> 「べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、英名 Red Salmon , Sockeye Salmon)」とは、北海道、千島、カムチャツカ半島、アラスカ、北米西海岸の北太平洋に分布するサケ属、サケ科の魚で、体長は 80 センチメートルから 90 センチメートル程度、体の背部と各ひれは青黒色、腹部は銀白色(産卵期のオスは赤色に変色)である。「べにざけ」は、他のさけと異なり肉に特有の赤身がある。  (絵省略)	0302.12 0303.10	<u>1.べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ)</u> 「べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、英名 Red Salmon , Sockeye Salmon)」とは、北海道、千島、カムチャツカ半島、アラスカ、北米西海岸の北太平洋に分布するサケ属、サケ科の魚で、体長は 80 センチメートルから 90 センチメートル程度、体の背部と各ひれは青黒色、腹部は銀白色(産卵期のオスは赤色に変色)である。「べにざけ」は、他のさけと異なり肉に特有の赤身がある。  (絵省略)	
0302.12 0303.19	<u>1.ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク)</u> 「ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク、英名 Silver Salmon, Coho Salmon)」とは、北海道、沿海州からカリフォルニアに至る北洋に分布するサケ属、サケ科の魚で、体長は 85 センチメートル程度、尾びれ後縁は截(せつ)形、体色は背面が青緑色、腹面は銀白色、尾びれ上部に小黒点がある。  (絵省略)	0302.12 0303.10	<u>2.ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク)</u> 「ぎんざけ(オンコルヒュンクス・キストク、英名 Silver Salmon, Coho Salmon)」とは、北海道、沿海州からカリフォルニアに至る北洋に分布するサケ属、サケ科の魚で、体長は 85 センチメートル程度、尾びれ後縁は截(せつ)形、体色は背面が青緑色、腹面は銀白色、尾びれ上部に小黒点がある。  (絵省略)	

**関税分類例規集新旧対照表**

	新	旧	備 考
0302.35 0303.45	<p><u>1.くろまぐろ(トウヌス・ティヌス)</u></p> <p>「くろまぐろ(<i>Thunnus thynnus</i>、英名 Bluefin tuna)」とは、北太平洋及び北大西洋の温暖域に広く分布し、体長は 2.5 メートル程度、体の背部は濃青黒色、腹部は灰色である。</p> <p>なお、「みなみまぐろ(<i>Thunnus maccoyii</i>、英名 Southern Bluefin tuna)」は、「くろまぐろ」に似ているが第 0302.36 号、第 0303.46 号に分類されるまぐろである。「みなみまぐろ」の特徴としては、赤道より南に生息すること(ジャワ島、オーストラリア東海域、南海域、中部・東部太平洋の南半球に広く分布)、体の背部は晴青色、腹部は銀白色、尾部の隆起が黄色であること、及び体長が 1.8 メートル前後と「くろまぐろ」より小振りであることが挙げられる。</p> <p>( 絵省略 )</p>	<p>0302.39 0303.49</p> <p><u>1.くろまぐろ</u></p> <p>「くろまぐろ(<i>Thunnus thynnus</i>、英名 Bluefin tuna)」とは、北太平洋及び北大西洋の温暖域に広く分布し、体長は 2.5 メートル程度、体の背部は濃青黒色、腹部は灰色である。</p> <p>なお、「みなみまぐろ(<i>Thunnus maccoyii</i>、英名 Southern Bluefin tuna)」は、「くろまぐろ」に似ているが 0302.39 - 030、0303.49 - 030 に分類されるまぐろである。「みなみまぐろ」の特徴としては、赤道より南に生息すること(ジャワ島、オーストラリア東海域、南海域、中部・東部太平洋の南半球に広く分布)、体の背部は晴青色、腹部は銀白色、尾部の隆起が黄色であること、及び体長が 1.8 メートル前後と「くろまぐろ」より小振りであることが挙げられる。</p> <p>( 絵省略 )</p>	